

Przygotowanie do badania gastrokopii w trybie ambulatoryjnym

8 godzin przed badaniem nie należy spożywać posiłków stałych

4 godziny przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów, żuć gumy

LEKI

W dniu badania należy przyjąć stosowane na stałe leki z wyjątkiem leków stosowanych z powodu cukrzycy oraz leków zmniejszających krzepnięcie krwi (czas odstawienia tych ostatnich do ustalenia ze swoim lekarzem prowadzącym w zależności od stosowanego preparatu). U pacjentów obciążonych ryzykiem, w tym osób ze sztucznymi zastawkami serca, po przebytych zapaleniu wsierdza, z protezą naczyniową lub ze znacznie obniżoną liczbą krwinek białych bezpośrednio przed badaniem może być wskazane podanie antybiotyku. Decyzję o konieczności i sposobie podania antybiotyku podejmuje lekarz kierujący na badanie.

Przed badaniem

Badanie nie może być wykonane bez pisemnej zgody pacjenta. Przed badaniem należy wyjąć protezy zębowe. Poinformuj lekarza, jeżeli leczysz się na cukrzycę, nadciśnienie lub niedoczynność tarczycy oraz przyjmujesz leki zmniejszające krzepnięcie krwi.

Przebieg badania

Badanie przeprowadzane jest zwykle w pozycji leżącej na lewym boku. Przed wprowadzeniem endoskopu lekarz zakłada między zęby plastikowy ustnik (celem ochrony delikatnego instrumentu). Następnie wprowadza do jamy ustnej i gardła gastrokop, prosząc jednocześnie o wykonanie ruchu połkowego. Ten moment może być nieprzyjemny i wywołać uczucie dławienia. Spokojne, głębokie oddychanie sprawia, że badanie jest łatwiejsze do zniesienia dla pacjenta i pozwala lekarzowi na dokładniejsze zbadanie przewodu pokarmowego. Badanie trwa kilka minut i jest w zasadzie bezbolesne.

- **WAŻNE! Istnieje możliwość przeprowadzenia badania w krótkim znieczuleniu ogólnym. Lekarz kierujący na badanie stwierdza czy u pacjenta nie występują przeciwwskazania do badania w znieczuleniu ogólnym. Przygotowanie do badania jest takie samo natomiast trzeba zabrać ze sobą wyniki badań laboratoryjnych – ważne 14 dni: morfologia, sód, potas, INR, APTT,**

- Po badaniu

Proszę poinformować swojego lekarza, jeżeli w ciągu kilku godzin po badaniu odczuje Pani/Pan silny ból jamy brzusznej, albo zaobserwuje czarny stolec. Również w przypadku wystąpienia innych niepokojących objawów należy niezwłocznie poinformować swojego lekarza.

Jeśli zastosowane były środki znieczulające i/lub nasenne przeciwwskazana jest obsługa urządzeń wymagających koncentracji uwagi m.in. prowadzenie pojazdów mechanicznych do godzin porannych następnego dnia. **Prosimy przyjechać z osobą towarzyszącą.**

ZABIERZ ZE SOBA:

-dokument tożsamości

-dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia (jeżeli pacjent taką posiada) – np. wyniki badań diagnostycznych,